

Officieel (her) aanmeldingsformulier Trombosedienst

De afdeling is rechtstreeks bereikbaar via:
 t (0229) 257625 algemeen en voor patiënten
 t (0229) 257257 voor artsen (=dienstdoende analist via receptie WFG of dect 6187 intern voor artsen WFG)
 f (0229) 257068
 e trombosedienst@westfriesgasthuis.nl

Naam:
 Voorletters:
 Geboortenaam:
 Geb. datum: - - M V
 Adres:
 Postcode + woonplaats:
 BSN:
 Telefoonnr. patiënt:
 Mobielnr. patiënt:

Dit formulier dient volledig ingevuld te worden.

Hierbij verzoekt ondergetekende, behandelend arts, de antistollingsbehandeling te starten c.q. voort te zetten:

Naam: Ziekenhuis:
 Specialisme: Datum: Handtekening:
 Datum opname: Reden opname: Datum ontslag:
 Indicatie na opname gewijzigd: Ja, deel 1 en 2 invullen Nee, deel 2 invullen.

Antistollingsindicatie (z.o.z.): (invullen a.u.b.)
 indien u geen nadere aanwijzing geeft wordt bij de dosering de intensiteitsgroep gehanteerd die bij de betreffende indicatie behoort.

Indien hartkleprothese: Welk type: Locatie:
Afwijkende intensiteit, namelijk: reden:
 Duur van behandeling: weken maanden jaren/onbepaald
 Automatisch staken van de behandeling: Nee Ja, na hoeveel tijd?
 Is de patiënt al eerder behandeld bij een Trombosedienst? Nee Ja, datum/jaar? welke?
 Is medisch gezien huisbezoek noodzakelijk? Nee Ja, tot wanneer? Reden:

Doseringsgegevens voorgeschreven anticoagulantia en type anticoagulans:

Acenocoumarol Fenprocoumon Overige welke:

Datum v.a. start																				
INR																				
Dosering*																				

* Indien mogelijk graag opgeven vanaf startdosering

Afgesproken bloedafname datum - -

LMW Heparine Nee Ja, van (begindatum)..... tot (einddatum)
 LMWH staken als INR tweemaal de gewenste waarde heeft (>2.0) Ja Nee
 LMWH staken bij INR van:
 Zwangerschap Vermoedelijke bevallingsdatum:

Overige medicatie:

Risicoverhogende factoren

Onvoldoende geregelde hypertensie Diabetische retinopathie met bloedingen en/of Maligniteit
 (Recent) bloedende laesie in de tractus digestivus neovascularisatie Overige
 Verhoogde bloedingsneiging Leverinsufficiëntie
 Recente intracerebrale bloeding Nierinsufficiëntie
 Malabsorptie syndroom Wisselende mate van hartfalen (leverstuwning)

In te vullen door de trombosedienst:

Ordernummer:
 1^e prikdatum:
 Routenummer:

Administratie
naam + paraaf

Bloedafname door
naam + paraaf

Doseerarts
paraaf

De informatie op dit formulier is onder voorbehoud, de informatie op de website is leidend.

deel 1

deel 2

Deze pagina niet invullen

Indicatie voor Antistollingsbehandeling

De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:

1^e Intensiteitsgroep (1): Therapeutische range INR 2,0 - 3,0

2^e Intensiteitsgroep (2): Therapeutische range INR 2,5 - 3,5

Advies t.a.v. startdosering (voor nieuwe patiënten)

Fenprocoumon/Marcoumar® (tabl. à 3 mg)		Acenocoumarol (tabl. à 1 mg)		** Dosering zonodig aanpassen bijvoorbeeld bij oudere (≥70), zieke of gedecompenseerde patiënt. Aanmelden bij de trombosedienst voor INR bepaling zo snel mogelijk na de 2 ^e dag.	
Normaal	Aangepast**	Normaal	Aangepast**		
1 ^e dag	4	3	1 ^e dag	6	4
2 ^e dag	2	1	2 ^e dag	4	2
3 ^e dag	1	1/2	3 ^e dag	2	1

Hoofdgroep	Indicatie	Intensiteit
Atriumfibrilleren (AF)	AF, CHA ₂ DS ₂ VASc Score ≥1	1
	AF + (cerebrale) embolie, of hartfalen of reumatische mitralisklepstenose	1
	AF + reumatische mitralisklepstenose + recidief systemische embolie tijdens antistolling	1
	AF + stent bij acuut coronair syndroom	1
	AF + stent bij stabiel coronair lijden	1
Bioklep prothese en overige hartchirurgie	Bioklep prothese in mitralispositie	1
	Bioklep prothese + Risicofactor ¹	1
	Mitralis hartklepreconstructie	1
	Reumatische mitralishartklepstenose + VG ² systemische embolie of wijd linker atrium >55mm	1
Cardiomyopathie (EF < 35%) in bijzondere gevallen	Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2
	Cardiomyopathie + aneurysma cordis	1
Cerebrale embolie in bijzondere gevallen	Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur of clopidogrel bij PFO, of aneurysma atriumseptum	1
Kunstklep	Mechanische hartklep prothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling	2
	Mechanische hartklep prothese oude generatie ongeacht positie	2
	Mechanische aortahartklep prothese	1
	Mechanische aortahartklep prothese + Risicofactor ¹	2
	Mechanische mitralis, tricuspidalis of pulmonalis hartklep prothese	2
	Mechanische mitralis, tricuspidalis of pulmonalis hartklep prothese + Risicofactor ¹	2
Perifeer arterieel vaatlijden in bijzondere gevallen	Perifere arteriële embolie zonder AF	Op aangeven behandelaar
	Veneuze bypass	1
Pulmonale hypertensie	Pulmonale hypertensie	1
Primaire Veneuze Trombo Embolie	Eerste longembolie	1
	Eerste DVT been/bekken	1
	Eerste DVT arm	1
	Eerste DVT overige locaties	1
Recidief Veneuze Trombo Embolie	Recidief Longembolie en DVT bij adequate cumarinetherapie	2
	Recidief Longembolie en DVT zonder adequate cumarinetherapie	1
Overige (zeldzame) indicaties	(Recidiverende) Tromboflebitis	Op aangeven behandelaar
	Overige (zeldzame) indicaties	Op aangeven behandelaar

¹ Risicofactor: vergroot atrium, of (VG²) systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren

² Voorgeschiedenis