

Artsen regio West-Friesland

Kenmerk

**Doorkiesnumm
er**
0229-208220

Datum
15 december 2015

Geachte collegae,

De FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) heeft besloten met ingang van 1 januari 2016 de internationale therapeutische INR ranges te gaan hanteren. Deze beslissing is genomen mede op verzoek van de Richtlijnwerkgroep Antitrombotisch Beleid die de Richtlijn "Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose", CBO 2008 aan het herschrijven is.

Uit literatuurstudie is gebleken dat een iets lagere instelling geen significante invloed heeft op de effectiviteit van de behandeling mits de INR hoger is dan 2.0 terwijl het risico op bloedingen toeneemt bij een hogere INR.

Het hanteren van internationale waarden maakt het mogelijk de Nederlandse doseerkwaliteit te vergelijken met andere landen en er kan makkelijker worden deelgenomen aan internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Nieuwe streefwaarden

- 1^e intensiteit: het streefgebied van 2.5 – 3.5 wijzigen naar een therapeutische range 2.0 - 3.0 met een targetwaarde van 2.7
- 2^e intensiteit: het streefgebied van 3.0 – 4.0 wijzigen naar een therapeutische range 2.5 - 3.5 met een targetwaarde van 3.0

De omzetting zal op 1 januari a.s. automatisch gebeuren. Patiënten met een afwijkend streefgebied blijven vooralsnog in het afwijkend streefgebied. Na overleg met hun behandelend arts zal besloten worden of dit gehandhaafd blijft of dat er toch een aanpassing zal volgen.

Met collegiale groeten,

Maarten Bongaerts, medisch leider Trombosedienst Westfriesgasthuis
Jan van Rijn, hoofd Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst
mede namens DCWF (Erik van de Sande)